



BIONIME

prolife

Материал подготовила: врач — детский эндокринолог, организатор @shkola_diabeta_brest Козел Виктория Александровна.

СХЕМА ЧЕРЕДОВАНИЯ МЕСТ ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА

ИНЪЕКЦИИ В ВЫДЕЛЕННУЮ ЗОНУ ЗАПРЕЩЕНЫ

1. Проверьте проходимость иглы. Выпустите 1–2 ЕД инсулина, пока на кончике иглы не появится капелька.
 2. Освободите место на коже, куда будет вводиться инсулин. Протирать спиртом не нужно!
 3. Большим и указательным пальцами возьмите кожу в складку. Это позволит уменьшить вероятность попадания в мышцу.
 4. Введите иглу у основания кожной складки перпендикулярно под углом 45°.
 5. Удерживая складку, нажмите до упора поршень шприца. Подождите 10 секунд (считаем до 10) после введения инсулина, затем можно вынуть иглу. Только после этого отпустите кожную складку.
- ВАЖНО!** Меняйте иглу перед каждой инъекцией, накручивая новую непосредственно перед уколом.
- Чередуйте зоны инъекций каждую неделю. В рамках выбранного на неделю сектора по порядку чередуйте места инъекций от 1 до 7, пока неделя не закончится. После этого переходите в зону со следующей неделей.
- Внимание!** Между двумя инъекциями расстояние примерно на размер пальчика ребенка.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ

250,00 mm

178,00 mm